LIFTING BRACHIALE®

Interno Braccia

PER LA LASSITÀ CUTANEA
DELLA ZONA TRA L'ASCELLA E IL GOMITO

No Injection,
Yes Transdermic Technology®

LIFTING BRACHIALE
CREMA DI PROSEGUIMENTO

Lifting Brachiale Crema Transdermica si utilizza come proseguimento del trattamento urto Lifting Brachiale in Gel. Anche nella Crema sono contenute molecole attive a bassissimo peso molecolare che, testate con Celle di Franz, hanno dimostrato una marcata penetrazione negli strati cutanei, in particolare nell'epidermide e nel derma dove possono svolgere la loro azione contro la lassità cutanea dell'interno braccia e per favorirne il rassodamento.
Lifting Brachiale Crema contiene le stesse molecole funzionali presenti nel Gel del Trattamento Urto.

Modalità d'uso: La Crema si applica due volte al giorno, mattino e sera, su pelle pulita dosando circa una nocciola di crema per ciascuna zona brachiale. Far assorbire leggermente senza massaggiare. Le applicazioni vanno eseguite fino ad esaurimento della confezione.

Modalità d'uso: Aprire il flacone, prelevare 1 ml di gel con l'apposito dosatore, versarne 0,5 ml nel palmo della mano e applicarlo all'interno del braccio destro. Attendere 3 minuti per la penetrazione degli attivi. Ripetere l'operazione con l'interno del braccio sinistro. L'applicazione va effettuata mattina e sera per 28 giorni. Sciacquare il dosatore con acqua tiepida dopo l'uso. Alla fine del trattamento si può utilizzare la Crema di Proseguimento Lifting Brachiale in tubo da 100 ml.
Il trattamento va applicato su pelle perfettamente pulita.



LIFTING BRACHIALE - TRATTAMENTO URTO

Lifting Brachiale - Interno Braccia è un preparato dermo-cosmetico ad effetto lifting per la lassità cutanea che contraddistingue l'area del braccio maggiormente sottoposta a rilassamento (zona tra l'ascella e il gomito). La formula brevettata favorisce la riduzione del cedimento cutaneo aiutando a rassodare la parte per ritrovare una superficie più tesa e tonica. Lifting Brachiale contiene il complesso a penetrazione transdermica Lifteina, più 2 molecole specifiche per il lifting e il rassodamento della zona interno braccia.

Tabella di penetrazione
Componenti Specifici - Interno Braccia

Test condotto tramite Celle di Franz

Bacillus/Soybean Ferment Extract	75,5%
Hexapeptide-10	93,5%

Il flacone da 60 ml di gel di Lifting Brachiale e l'apposito Dosatore che compongono il Trattamento Urto

Entrambi i preparati Lifting Brachiale (Trattamento Urto e Crema di Proseguimento) sono disponibili in 2 dosaggi, con concentrazioni crescenti degli attivi:

- **Grado 1**: lassità evidente
- **Grado 2**: lassità grave

TABELLA DI PENETRAZIONE DELLE MOLECOLE ATTIVE
DEL COMPLESSO LIFTEINA

TEST CONDOTTO TRAMITE CELLE DI FRANZ

Componenti ad effetto meccanico

1,6-Alpha- Linked Maltotriose	70,5%
Silicate	65,8%

Componenti ad effetto biologico dermo-cosmetico

Glycine	75,9%
Proline	51,5%
Alanine	22,4%
Tripeptide-10 Citrulline	80,4%
DMAE	54,3%

Labo Transdermic Technology

La cute è difficilmente permeabile: per far sì che le molecole funzionali del Complesso Lifteina ne penetrino i diversi livelli i ricercatori Labo hanno messo a punto una Tecnologia Transdermica che si fonda sul bassissimo peso molecolare delle sostanze attive: esso diviene la condizione fondamentale per la loro penetrazione negli strati cutanei cui è legata la loro reale efficacia. Le percentuali riportate si riferiscono alla penetrazione transdermica a 24 ore delle molecole attive funzionali, in soluzione, ottenuta con la nuova tecnologia Labo e testata tramite Celle di Franz.

◀ La **Cella di Franz** è lo strumento di laboratorio con cui è stata testata la capacità di penetrazione nella pelle delle molecole che compongono il Complesso Lifteina

LIFTEINA: PER LA LASSITÀ E LA FLACCIDITÀ CUTANEA

Le molecole attive sottoposte a deposito di brevetto svizzero denominato Lifteina, tutte a penetrazione transdermica, sono in grado di svolgere un effetto di ricompattamento della cute in eccesso in alcune zone specifiche del corpo tramite due distinte azioni: una meccanica e una biologica.

Azione meccanica

- ***1,6-Alpha-Linked Maltotriose***
- ***Silicate***

Sono sostanze che distribuendosi sulla pelle come una sorta di «armatura» creano una reticolazione a livello mediano della cute per un effetto ricompattante e restringente.
Tale reticolazione rinforza il tessuto connettivo, riducendo la lassità e il cedimento cutaneo.

Azione biologica dermo-cosmetica

- I 3 amminoacidi ***Prolina, Alanina*** e ***Glicina*** vengono coinvolti nella sintesi del Collagene.
- ***Tripeptide-10 Citrulline*** mima la sequenza della Decorina, ovvero del peptide che controlla il processo di fibrillogenesi, connesso con dimensioni e organizzazione delle fibrille del Collagene.
- ***DMAE (Dimethylaminoethanol Tartrate)*** favorisce l'aumento dello spessore del derma, contribuendo, insieme agli altri attivi ad azione biologica, all'effetto lifting del preparato.

Gli attivi del complesso Lifteina sono a Tecnologia Transdermica, pertanto la loro penetrazione cutanea, testata tramite Celle di Franz, è coadiuvata dal loro basso peso molecolare e dalla presenza dei 3 Enhancer (Decylene Glycol, Caprylyl Glycol e Pentylene Glycol).